

แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (MERS)

เกณฑ์การวินิจฉัย

แพทย์ต้องระบุให้ชัดเจนโดยบอกตำแหน่งอวัยวะที่ติดเชื้อ หรือเป็นโรค เช่น ปวดบวม คออักเสบ หลอดลมอักเสบ แล้วตรวจพบร่วมกับติดเชื้อโคโรนาไวรัส

ตัวอย่าง

- กรณีผู้ป่วยมีอาการปวดบวม (Pneumonia) พบร่วมกับติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Coronavieus) แพทย์ควรสรุปการวินิจฉัยเป็น Pneumonia MERS

- กรณีผู้ป่วยมี Acute pharyngitis พบร่วมกับติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Coronavirus) แพทย์ควรสรุปการวินิจฉัยเป็น Acute pharyngitis MERS เป็นต้น

หมายเหตุ ไม่ควรเขียน MERS คำเดียว เพราะเป็นคำกำกวม

เกณฑ์การให้รหัส

ให้รหัสตามแพทย์วินิจฉัย

ตัวอย่าง

- แพทย์วินิจฉัย Pneumonia MERS ให้รหัส J12.8 Other viral Pneumonia ร่วมกับ B97.2 Coronavirus as the cause of diseases classified to other chapters

- แพทย์วินิจฉัย Acute pharyngitis MERS ให้รหัส J02.8 Acute pharyngitis due to other specified organisms ร่วมกับ B97.2 Coronavirus as the cause of diseases classified to other chapters

หมายเหตุ รหัส B34.2 Coronavirus infection, unspecified เป็นรหัสกำกวมไม่ควรให้ ไม่สามารถระบุได้ว่าติดเชื้อนี้แล้วเป็นโรคอะไร

Thai Health Coding Center
WHO-FIC Collaborating Center, Thailand
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข